


专业2部分营养液系列



| | | CALI PRO GROW A | CALI PRO GROW B | CALI PRO BLOOM A | CALI PRO BLOOM B | EMERALD GODDESS | KING KOLA | HONEY CHOME | ROOT WIZARD |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 专业2部分营养液系列 | | | | 高级植物滋补剂 | 强力开花提升剂 | 香气和树脂增强剂 | 硕大根茎促成剂 |
| 营养生长期 18 小时光照 | 育苗及扦插 | 2 mL | 2 mL | - | - | - | - | - | - |
| | 移植 | 3 mL | 3 mL | - | - | - | - | - | - |
| | 营养生长早期 | 4 mL | 4 mL | - | - | 6 mL | - | 4 mL | 15 mL |
| | 营养生长晚期 | 5 mL | 5 mL | - | - | 6 mL | - | 4 mL | - |
| 花期 12 小时光照 | 第1周 过渡 | 5 mL | 5 mL | - | - | 6 mL | 4 mL | 4 mL | - |
| | 第2周 花期早期 | - | - | 5 mL | 5 mL | 8 mL | 8 mL | 8 mL | 15 mL |
| | 第3周 花期早期 | - | - | 5 mL | 5 mL | 8 mL | 8 mL | 8 mL | - |
| | 第4周 花期中期 | - | - | 6 mL | 6 mL | 10 mL | 12 mL | 8 mL | - |
| | 第5周 花期中期 | - | - | 6 mL | 6 mL | 10 mL | 12 mL | 8 mL | - |
| | 第6周 花期晚期 | - | - | 6 mL | 6 mL | 10 mL | 8 mL | 8 mL | - |
| | 第7周 花期晚期 | - | - | 6 mL | 6 mL | 10 mL | 8 mL | 8 mL | - |
| | 第8周 成熟 | - | - | 6 mL | 6 mL | 5 mL | 4 mL | 6 mL | - |
| | 第9周 旺盛 | - | - | 1 mL | 1 mL | - | - | 6 mL | - |

此施肥表适用于循环水系统或排废水系统中的所有生长介质。不要预混合浓缩营养液。先往贮液器中注入水，再添加营养液。始终先用清水混合 A 型营养液，再添加 B 型营养液。如果采用更激进的施肥方案，须监控植物的生长状态以免营养过剩。

为了延长营养生长期，可重复一周或多周的营养生长晚期。为了延长花期，可重复一周或多周的花期中期。混合营养液后的理想 pH 范围是 5.8-6.3。理想水温是 60-72°F (16-22°C)。

快速换算

| 茶匙 (tsp) | 毫升 (mL) | 汤匙 (tbsp) | 盎司 (oz) |
|-----------|-----------|------------|---------|
| 1/4 tsp | 1 mL | - | - |
| 1 tsp | 5 mL | 1/3 tbsp | - |
| 1 1/2 tsp | 7,5 mL | 1/2 tbsp | - |
| 3 tsp | 15 mL | 1 tbsp | 1/2 oz |
| 6 tsp | 30 mL | 2 tbsp | 1 oz |
| 升 (L) | 美国夸脱 (qt) | 美国加仑 (gal) | |
| 0,95 L | 1 qt | - | |
| 1,89 L | 2 qt | - | |
| 3,79 L | - | 1 gal | |
| 22,71 L | - | 6 gal | |

其他 Emerald Harvest 补充剂

| pH UP | pH DOWN | CAL-MAG | STURDY STALK® |
|------------------------------------|-----------|---|---------------|
| 优质 pH 碱化剂 | 优质 pH 酸化剂 | 钙镁补充剂 | 硅酸钾补充剂 |
| 一次一点地涂抹在营养液上，定期测试 pH 值，直到读数达到所需范围。 | | 在从营养生长早期至花期晚期之间的必要时段使用，用量为每加仑使用 2-5 毫升。建议仅在浇灌日使用。 | |




单位是毫升/每加仑水。

emeraldharvest.co



EMERALD HARVEST®
SIMPLE, EASY SUCCESS

专业3部分营养液系列



| | | GROW | MICRO | BLOOM | EMERALD GODDESS® | KING KOLA® | HONEY CHOME® | ROOT WIZARD® |
|------------------|----------|------------|-------|-------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | | 专业3部分营养液系列 | | | 高级植物滋补剂 | 强力开花提升剂 | 香气和树脂增强剂 | 硕大根茎促成剂 |
| 营养生长期 18 小时光照 | 育苗及扦插 | 2 mL | 2 mL | 2 mL | - | - | - | - |
| | 移植 | 4 mL | 2 mL | 1 mL | - | - | - | - |
| | 营养生长早期 | 6 mL | 3 mL | 2 mL | 6 mL | - | 4 mL | 15 mL |
| | 营养生长晚期 | 8 mL | 4 mL | 2 mL | 6 mL | - | 4 mL | - |
| 花期 12 小时光照 | 第1周 过渡 | 4 mL | 4 mL | 4 mL | 6 mL | 4 mL | 4 mL | - |
| | 第2周 花期早期 | 2 mL | 4 mL | 8 mL | 8 mL | 8 mL | 8 mL | 15 mL |
| | 第3周 花期早期 | 2 mL | 4 mL | 8 mL | 8 mL | 8 mL | 8 mL | - |
| | 第4周 花期中期 | 2 mL | 5 mL | 10 mL | 10 mL | 12 mL | 8 mL | - |
| | 第5周 花期中期 | 2 mL | 5 mL | 10 mL | 10 mL | 12 mL | 8 mL | - |
| | 第6周 花期晚期 | - | 6 mL | 11 mL | 10 mL | 8 mL | 8 mL | - |
| | 第7周 花期晚期 | - | 6 mL | 11 mL | 10 mL | 8 mL | 8 mL | - |
| | 第8周 成熟 | - | 4 mL | 11 mL | 5 mL | 4 mL | 6 mL | - |
| | 第9周 旺盛 | 2 mL | 2 mL | 2 mL | - | - | 6 mL | - |

此施肥表适用于循环水系统或排废水系统中的所有生长介质。
不要预混合浓缩营养液。
先往贮液器中注入水，再添加营养液。
始终先用清水混合Micro营养液，再添加Grow和/或Bloom营养液。
如果采用更激进的施肥方案，须监控植物的生长状态以免营养过剩。

为了延长营养生长期，可重复一周或多周的营养生长晚期。
为了延长花期，可重复一周或多周的花期中期。
混合营养液后的理想pH范围是 5,8-6,3。
理想水温是60-72°F (16-22°C)。

快速换算

| 茶匙 (tsp) | 毫升 (mL) | 汤匙 (tbsp) | 盎司 (oz) |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 1/4 tsp | 1 mL | - | - |
| 1 tsp | 5 mL | 1/3 tbsp | - |
| 1 1/2 tsp | 7.5 mL | 1/2 tbsp | - |
| 3 tsp | 15 mL | 1 tbsp | 1/2 oz |
| 6 tsp | 30 mL | 2 tbsp | 1 oz |

| 升 (L) | 美国夸脱 (qt) | 美国加仑 (gal) |
|---------|-----------|------------|
| 0,95 L | 1 qt | - |
| 1,89 L | 2 qt | - |
| 3,79 L | - | 1 gal |
| 22,71 L | - | 6 gal |

其他Emerald Harvest补充剂

| pH UP | pH DOWN | CAL-MAG | STURDY STALK® |
|----------------------------------|---------|---|---------------|
| 优质pH碱化剂 | 优质pH酸化剂 | 钙镁补充剂 | 硅酸钾补充剂 |
| 一次一点地涂抹在营养液上，定期测试pH值，直到读数达到所需范围。 | | 在从营养生长早期至花期晚期之间的必要时段使用，用量为每加仑使用2-5毫升。建议仅在浇灌日使用。 | |



单位是毫升/每加仑水。

emeraldharvest.co



EMERALD HARVEST®
SIMPLE, EASY SUCCESS